

**FICHE****Indications prioritaires du lait de lactarium issu de don anonyme**

Validée par le Collège le 12 mai 2021

**Fiche outil****Indications prioritaires du lait de lactarium issu de don anonyme en l'absence de lait maternel ou si celui-ci est insuffisant****Nouveau-né prématuré et de faible poids à la naissance**

Enfant prématuré de terme inférieur et/ou égal à 32 SA et/ou de poids à la naissance inférieur ou égal à 1 500 g	Systematiquement
Enfant prématuré de terme entre 32 SA et 34 SA inclus et/ou de poids à la naissance entre 1 500 g et 1 800 g inclus	Uniquement quand les deux conditions suivantes sont remplies : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. les besoins des enfants de terme inférieur ou égal à 32 SA et/ou de poids à la naissance inférieur ou égal à 1 500 g sont couverts ;</li> <li>2. les stocks de lait de don disponibles dans les lactariums sont suffisants.</li> </ol>
Enfant prématuré de terme supérieur à 34 SA et/ou de poids à la naissance supérieur à 1 800 g	Situations à prioriser en fonction des stocks : <ul style="list-style-type: none"> <li>– retard de croissance sévère &lt; 3<sup>e</sup> percentile ;</li> <li>– début d'alimentation de la première semaine de vie ;</li> <li>– entéropathie rendant difficile la progression de l'alimentation entérale ;</li> <li>– réalimentation post-entérocolite ulcéro-nécrosante ;</li> <li>– cardiopathie congénitale ;</li> <li>– autres situations après évaluation par l'équipe soignante.</li> </ul>
<b>Pathologie digestive néonatale prioritaire</b>	
<b>Le laparoschisis</b>	En post-opératoire d'un laparoschisis.

## Indications non prioritaires du lait de lactarium issu de don anonyme en l'absence de lait maternel ou si celui-ci est insuffisant

<b>Cardiopathies congénitales</b>	Au cas par cas en fonction d'éventuels facteurs de risque surajoutés (prématurité, hypotrophie...).
<b>Pathologies digestives néonatales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Certaines pathologies digestives néonatales (par exemple : maladie de Hirschsprung, omphalocèle).</li><li>– Dans les suites d'une entérocolite ulcéro-nécrosante.</li></ul>
<b>Hernie diaphragmatique congénitale, atrésie de l'œsophage</b>	Au cas par cas.
<b>Encéphalopathie néonatale anoxo-ischémique traitée par hypothermie thérapeutique</b>	Au cas par cas.

## Non-indications du lait de lactarium issu de don anonyme

<b>Les maladies héréditaires du métabolisme</b>	<p>Lorsqu'une maladie héréditaire du métabolisme est diagnostiquée chez un nouveau-né, il est important de discuter avec un médecin spécialisé en maladies héréditaires du métabolisme, s'il y a contre-indication ou non du lait maternel.</p> <p>Pour certaines maladies (par exemple : la galactosémie), le lait humain est contre-indiqué.</p> <p>Pour d'autres maladies du métabolisme, le lait maternel peut être prescrit en quantité mesurée et sous la supervision d'un médecin métabolicien.</p>
<b>Néphropathies néonatales</b>	<p>La teneur en protéides et en phosphore du lait de don anonyme est variable et non mesurée de façon systématique par les lactariums.</p> <p>Les données de la littérature disponibles à ce jour ne permettent pas de recommander de prescrire du lait de lactarium issu de don anonyme en cas de néphropathie néonatale ou d'insuffisance rénale chronique et d'absence ou d'une insuffisance de lait maternel.</p>
<b>Greffe de moelle et déficit immunitaire chez le nourrisson</b>	<p>Les données de la littérature disponibles à ce jour ne sont pas d'un niveau de preuve assez élevé pour recommander le lait de lactarium issu de don anonyme en cas de déficit immunitaire et de greffe de moelle.</p> <p>Remarque : la pasteurisation du lait de la propre mère (don personnalisé) peut permettre d'autoriser sa prescription.</p>

## Les contre-indications du lait de lactarium issu de don anonyme

<b>Intolérance aux protéines du lait de vache</b>	<p>Les caractéristiques physico-chimiques du lait de lactarium issu de don anonyme ne permettent pas de garantir l'absence de protéines de lait de vache.</p> <p>Il n'est pas recommandé de prescrire du lait de lactarium issu de don anonyme pour cette indication.</p>
<b>Chylothorax congénital</b>	<p>La composition en graisse du lait maternel n'est pas adaptée à la prise en charge nutritionnelle initiale du chylothorax. Il n'est pas recommandé de prescrire du lait de lactarium issu de don anonyme pour cette indication.</p>

Ce document présente les points essentiels de la publication : **Indications prioritaires du lait de lactarium issu de don anonyme** mai 2021

Toutes nos publications sont téléchargeables sur [www.has-sante.fr](http://www.has-sante.fr)