

Tableau du traitement du choc anaphylactique. Auto-injecteurs d'adrénaline (AIA) :
dosages, noms commerciaux, indications.

| Dosage (μg) | Noms commerciaux | Indications en fonction du poids |
|--------------------------|---|---|
| 150 | <ul style="list-style-type: none">▪ Anapen[®] 150 μg/3 ml▪ Emerade[®] 150 μg▪ EpiPen 0,15/0,3 ml[®]▪ Jext 150 μg[®] | <ul style="list-style-type: none">▪ Poids de 7,5 kg à 25 kg* |
| 300 | <ul style="list-style-type: none">▪ Anapen[®] 300 μg/0,3 ml▪ Emerade[®] 300 μg▪ EpiPen[®] 0,3 mg/0,3 ml▪ Jext[®] 300μg | <ul style="list-style-type: none">▪ Poids > 25 kg▪ Poids > 60 kg |
| 500 | <ul style="list-style-type: none">▪ Emerade[®] 500 μg | <ul style="list-style-type: none">▪ Poids > 60 kg |

* Pour les enfants de moins de 15 kg, il n'existe pas d'AIA adapté.

Toutefois, en cas de risque vital, l'utilisation d'un AIA dosé à 150 μg est préconisée par la Société française de médecine d'urgence, dès 7,5 kg.