

nirsévimab  
CAMPAGNE 2024-2025

Services concernés

Maternité, gynécologie obstétrique  
pédiatrie, néonatalogie

## 1 Prescription



Médecins, sages-femmes

## INDICATION

**Prévention** des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS) chez les **nouveau-nés et les nourrissons au cours de leur première saison** de circulation du VRS

Population éligible pour la campagne 2024-2025 (1ère saison de circulation du VRS) :

- Nourrissons nés à partir du **1er janvier 2024** pour la **Métropole, la Guyane, la Martinique, St Martin et St Barthélémy**
- A partir du **1er février 2024** pour la **Réunion et la Guadeloupe**
- A partir du **15 mars 2024** pour **Mayotte**

**Possibilité d'immuniser dès la naissance** - recommandé avant la sortie de maternité à partir du **15 septembre 2024**

Contre-indication : hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients

**POSOLOGIE** En fonction du **poids** du nourrisson➔ poids < 5kg : dose unique de **50 mg**➔ poids ≥ 5kg : dose unique de : **100 mg**➔ Alternative possible pour les nourrissons à haut risque éligibles : **SYNAGIS®** (palivizumab)

## 2 Approvisionnement - Dispensation par les PUI



## APPROVISIONNEMENT ET COMMANDES

- Approvisionnement : par les centrales d'achat UniHa, ResaH, régionales et privées
- Commandes **directe** auprès du laboratoire SANOFI via un **formulaire en ligne** ➔ *Possible dès juillet 2024*

## LIVRAISON

- Commande avant le 06/09/24 : livraison à partir du 10/09/24
- Commande à partir du 09/09/24 : livraison sous 48 à 72h (jours ouvrés)

## PRISE EN CHARGE

- Compensation forfaitaire après déclaration des UCD administrés au cours d'une hospitalisation
- Déclaration PMSI via **support de recueil des médicaments disposant d'une Autorisation d'Accès compassionnel** (AAC) - code indication et notice ATIH à venir

## 3 Administration



seringue préremplie

Médecins

IDE

Sages-femmes

➔ Administré uniquement par **voie intramusculaire** de préférence dans la partie antérolatérale de la **cuisse**

🔍 Vérifier les étiquettes sur l'emballage extérieur afin de s'assurer d'avoir choisi la bonne présentation 50 ou 100mg

➔ Possibilité de **co-administration avec les vaccins** de l'enfance

👉 Chaque produit doit être administré à l'aide d'une seringue différente et à des sites d'injection distincts

**Effets indésirables potentiels** : éruption cutanée (rash), réaction au site d'injection (induration, œdème et douleur), fièvre

🚨 En cas d'apparition de signes et symptômes d'une réaction cliniquement significative d'hypersensibilité ou d'anaphylaxie, arrêter immédiatement l'administration et débiter un traitement médicamenteux et/ou des soins de soutien appropriés.

📢 Pour toute suspicion d'effet indésirable ou question relative à sa sécurité (interactions, contre-indication, bon usage...) contactez votre Centre régional de pharmacovigilance (**CRPV**) ou **signalement.social-sante.gouv.fr**➔ **Traçabilité** dans le carnet de santé de l'enfant : dose, lot et date

## Liens utiles

Note d'information du 6 juin 2024 relative aux modalités de mise en œuvre de la campagne 2024-2025.

DGS\_Urgent n°2024\_10 du 03/07/24 : CAMPAGNE D'IMMUNISATION DES NOUVEAU-NÉS ET NOURRISSONS CONTRE LES INFECTIONS A VRS POUR LA SAISON 2024-2025

Décret n° 2023-878\_14/09/23 (liste des médicaments autorisés à la prescription des sages-femmes) HAS\_beyfortus

RCP européen\_beyfortus\_EMA ANSM-beyfortus-lettre-aux-professionnels-230823

## UNE QUESTION ?

**Contact OMEDIT**  
omedit@omedit-nagg.fr  
05.57.01.47.00