



Âge	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	11 mois	12 mois	16-18 mois	6 ans
BCG										
DTCaP (diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite)										
Hib (Haemophilus influenzae de type b)										
Hépatite B										
Pneumocoque										
Méningocoque B										
Méningocoques ACWY										
ROR (rougeole, oreillons, rubéole)										
Rotavirus				si RotaTeq®						
VRS (Bronchiolite) (Virus Respiratoire Syncytial)	Anticorps monoclonaux*					Anticorps monoclonaux**				

DTCaP, Hib, Hépatite B, Pneumocoque, Méningocoque B, Méningocoques ACWY, ROR Vaccinations obligatoires (méningocoques ACWY et B depuis le 1^{er} Janvier 2025)

*Si la mère ne s'est pas fait vacciner pendant la grossesse

**La dose est déterminée selon le poids au moment de l'injection (1 injection protégée pendant toute la saison ; il n'y a pas de rappel lorsque l'enfant atteint 5 kg;

Tuberculose (BCG)

Le vaccin contre la tuberculose est recommandé à partir de l'âge de 1 mois avec 1 dose avant la sortie de la maternité pour les enfants originaires de Guyane, de Mayotte ou ayant un membre de l'entourage atteint d'une tuberculose récente (moins de 5 ans). La vaccination peut être proposée si un départ est prévu en zone endémique.

Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite (DTCaP)

Primo vaccination en deux doses à deux mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois.

Haemophilus Influenzae de type b (Hib)

Primo vaccination en 2 doses à 2 mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois. Vaccin combiné avec le vaccin DTCaP.

Hépatite B

Primovaccination en 2 doses à 2 mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois et à 4 mois, suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois. Vaccin combiné avec le vaccin DTCaP ou non.

Pneumocoque

Depuis le 31 juillet 2026, la primovaccination est en 3 doses, à 2 mois d'intervalle, à l'âge de 2 mois, 4 mois et 6 mois suivi d'un rappel à l'âge de 11 mois.

Méningocoque B

Depuis le 1^{er} janvier 2025, la vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons. 1^{ère} dose à l'âge de 3 mois, 2^{ème} dose à l'âge de 5 mois et 3^{ème} dose à l'âge de 12 mois.

Méningocoques ACWY

Depuis le 1^{er} janvier 2025, la vaccination est obligatoire chez tous les nourrissons. 1^{ère} dose à l'âge de 6 mois et 2^{ème} dose à l'âge de 12 mois.

ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole)

1^{ère} dose à l'âge de 12 mois puis 2^{ème} dose entre 16 et 18 mois.

Rotavirus

Vaccin recommandé à tous les nourrissons à partir de 2 mois avec 2 à 3 doses (par voie orale).

VRS (Virus Respiratoire Syncytial)

1 dose d'Anticorps monoclonaux dès la naissance pendant la période épidémique si pas de vaccination maternelle.

